

**EVIDENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD**

**Herramienta de evaluación de la implementación del  
ALGORITMO DE ATENCIÓN CLÍNICA DE DEPRESIÓN**

No. DE FOLIO: \_\_\_\_\_ ENTIDAD FEDERATIVA: \_\_\_\_\_ FECHA DE EVALUACIÓN: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ INSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_

CÓDIGO Y PUESTO: \_\_\_\_\_ ADSCRIPCIÓN: \_\_\_\_\_ TURNO: \_\_\_\_\_

**Padecimientos CIE 10 incluidos:**

- 2573 Depresión postesquizofrénica
- 2593 Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo
- 2609 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado
- 2610 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
- 2611 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos
- 2616 Episodio depresivo
- 2617 Episodio depresivo leve

Favor de seleccionar: **cumple** si se encuentra evidencia en el expediente clínico de todos los elementos contenidos en la pregunta, de no contar con algún elemento señalado, se debe evaluar como **no cumple**.

No. de Expediente \_\_\_\_\_

Preguntas a revisar en el expediente clínico del participante	Cumple	No cumple
1.- Existe evidencia en el expediente clínico, que en el paciente mayor de 59 años se realizó la búsqueda intencionada de enfermedades metabólicas, abuso y dependencia de sustancias		
2.- Existe evidencia en el expediente clínico del paciente con depresión, que se ha realizado de la evaluación del riesgo de suicidio		
3.- Existe evidencia en el expediente clínico del paciente con depresión moderada, que se ha iniciado de manera conjunta el tratamiento farmacológico y no farmacológico.		
4.- Existe evidencia en el expediente clínico del paciente con depresión que el tratamiento farmacológico inicial es con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina		
5.- Existe evidencia en el expediente clínico del paciente con depresión que se ha realizado la referencia a segundo nivel de atención en caso de haber baja o nula respuesta al tratamiento posterior a la utilización de la dosis terapéutica y por el tiempo mínimo necesario; o en abuso de sustancias; tener comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos; o presentar ideaciones o intentos suicidas.		
TOTAL		

Debe cumplir con al menos 3 ítems para ser considerada la evaluación como satisfactoria.